

ALLEGATO B

INSERIMENTO NUOVA SCHEDA “BIETOLA ROSSA DA ORTO” ALL’AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA E DISERBO – ANNO 2019 – approvate con Decreto Dirigenziale n. 3682 del 18/03/2019

SCHEDA DIFESA N°22 / A BIETOLA ROSSA DA ORTO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti - eliminare la vegetazione infetta Interventi chimici: - intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico	
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)		Zolfo	Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	
Mal dello Sclerozio (<i>Sclerotium rolfsii</i>)			Interventi agronomici: - estirpare dal terreno le piante colpite e bruciarle - evitare la coltivazione sullo stesso terreno per 3-4 anni	
Batteriosi		<i>Prodotti rameici</i>	Interventi agronomici: - estirpare dal terreno le piante colpite e bruciarle	
PARASSITI ANIMALI				
Afidi	1	<i>Piretrine pure</i> Maltodestrina	Interventi chimici: - intervenire in presenza di infestazioni diffuse	
Altica (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	1	Deltametrina	Interventi chimici: - Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti	
Mosca (<i>Pegomia betae</i>)		<i>Piretrine pure</i>	Interventi chimici: - intervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle mine appena formate	

SCHEDA DISERBO N°22 / A – BIETOLA ROSSA DA ORTO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Metamitron	30.4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Metamitron Cloridazon (2)		
POST-EMERGENZA	Dicotiledoni		Metamitron Fenmedifan		

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Cloridazon: al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.