

Tipo di esposizione	Vaccinazione antirabbica	Immunoglobuline antirabbiche	Profilassi antitetanica	Trattamento locale della lesione
Toccare o nutrire l'animale, lambitura di pelle integra	no	no	no	Detersione della zona
Morsicatura leggera di pelle scoperta; graffiature minori o abrasioni senza sanguinamento; lambitura di pelle abrasa	Sì. Compilazione anamnesi prevaccinale, vaccinazione multisito abbreviata * con doppia dose tempo zero: 1 dose braccio destro 1 dose braccio sinistro mai nella regione glutea	No se effettuata vaccinazione con scheda multisito abbreviata	Verificare sul tesserino delle vaccinazioni la situazione e seguire la procedura della profilassi antitetanica post esposizione	Detersione della zona Disinfezione con ammonio quaternario allo 0,1 % o Acqua Ossigenata o Tintura di iodio Non suturare se non strettamente necessario Eventuale profilassi antibiotica
Morsicatura o graffiature transdermiche singole o multiple; contaminazione di mucose con saliva	Sì. Compilazione anamnesi prevaccinale, vaccinazione multisito abbreviata con doppia dose tempo zero: 1 dose braccio destro 1 dose braccio sinistro mai nella regione glutea	Sì. Dosaggio 20UI/Kg im. In sito diverso da quello del vaccino	Verificare sul tesserino delle vaccinazioni la situazione e seguire la procedura della profilassi antitetanica post esposizione	Detersione della zona Disinfezione con ammonio quaternario allo 0,1 % o Acqua Ossigenata o Tintura di iodio Non suturare se non strettamente necessario Eventuale profilassi antibiotica Se possibile iniettare ½ dose delle IGG antirabbiche nella ferita o infiltrare l'area circostante

* Vaccinazione multisito abbreviata : schema 2-1-1 (due dosi al tempo zero, 1 dose al giorno 7, 1 dose al giorno 21) questa scheda induce una precoce risposta anticorpale e può essere particolarmente efficace quando il trattamento postesposizione non include la somministrazione di Immunoglobuline antirabbiche