

Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE) Ed. 2013, DATI 2012, (SDO 2005-2012)

ESITI TOSCANA 2012

Firenze, 2 Ottobre 2013




Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Area Clinica Cardiovascolare


Erogatore

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero




59 ricoveri


Asl di residenza




Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero



Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni




Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 giorni




Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero

Erogatore




Asl di residenza



Erogatore


Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni



Area Clinica Cerebrovascolare

Erogatore

Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero




Area Chirurgica




Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Colecistectomia in regime ordinario/ day surgery : proporzione di colecistectomie laparoscopiche




Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni



Erogatore

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni




Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale


Erogatore

Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico




Erogatore

Frattura della Tibia/Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico




Erogatore

Frattura del collo del femore: mortalità a 30gg




Intervento chirurgici per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni dal ricovero




Erogatore

Intervento chirurgici per TM al colon: mortalità a 30 giorni dal ricovero




Erogatore

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni dall'intervento





Tassi di “deospedalizzazione” Il territorio cura

Ospedalizzazione per scompenso cardiaco



Provincia di
residenza

Ospedalizzazione per gastroenterite pediatrica




Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Ospedalizzazione per chirurgia elettiva

Provincia di residenza


Tonsillectomia:



Una visione di sintesi nel confronto con le altre regioni

Erogatore

Percentuale di indicatori per Regione



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Indicatori per Erogazione

Regione di Erogazione	N. strutture di erogazione	N. indicatori per regione	N. strutture colore blu	N. strutture colore grigio	N. strutture colore Rosso	% Blu	% Grigio	% Rosso
ABRUZZO	26	39	38	241	84	10,47	66,39	23,14
BASILICATA	8	36	15	111	33	9,43	69,81	20,75
CALABRIA	38	34	35	270	76	9,19	70,87	19,95
CAMPANIA	105	38	125	775	292	10,49	65,02	24,50
EMILIA ROMAGNA	78	38	194	673	121	19,64	68,12	12,25
FRIULI VENEZIA GIULIA	21	38	51	217	30	17,11	72,82	10,07
LAZIO	88	39	123	751	211	11,34	69,22	19,45
LIGURIA	23	41	61	238	59	17,04	66,48	16,48
LOMBARDIA	146	39	375	1.508	293	17,23	69,30	13,47
MARCHE	31	38	59	295	66	14,05	70,24	15,71
MOLISE	8	30	6	50	16	8,33	69,44	22,22
PIEMONTE	60	39	180	653	133	18,63	67,60	13,77
PROV. AUTON. BOLZANO	8	33	24	64	21	22,02	58,72	19,27
PROV. AUTON. TRENTO	9	34	22	70	12	21,15	67,31	11,54
PUGLIA	70	39	98	598	201	10,93	66,67	22,41
SARDEGNA	35	39	32	267	70	8,67	72,36	18,97
SICILIA	101	41	163	789	230	13,79	66,75	19,46
TOSCANA	55	39	191	557	71	23,32	68,01	8,67
UMBRIA	16	38	36	180	33	14,46	72,29	13,25
VALLE D` AOSTA	1	27	6	16	5	22,22	59,26	18,52
VENETO	62	40	161	748	115	15,72	73,05	11,23

Indicatori considerati

Indicatori Considerati
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni
Colecistectomia in regime day surgery: altro intervento a 30 giorni
Colecistectomia in regime day surgery: complicanze a 30 giorni
Colecistectomia in regime ordinario/day surgery: proporzione di colecistectomie laparoscopiche
Colecistectomia in regime ordinario: proporzione di colecistectomie laparoscopiche
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni
Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in regime ordinario con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero
IMA: MACCE a 1 anno
IMA: Mortalità a 1 anno
IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni
IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore
Intervento chirurgico per TM colon: % interventi in laparoscopia
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni dall'intervento
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni
Intervento chirurgico per TM retto: % interventi in laparoscopia
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni
Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi
Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 giorni
PTCA eseguita oltre 48 ore dal ricovero per Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dall'intervento
Parti: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (cesarei)
Parti: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (naturali)
Parti: riammissioni ospedaliere durante il puerperio (cesarei)
Parti: riammissioni ospedaliere durante il puerperio (naturali)
Proporzione di parti con taglio cesareo primario
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni

