

## Fase 2 – Estremamente vulnerabili, a prescindere dall'età (1 di 2)

| Aree di patologia   | Definizione  |
|---|--|
| 01-BPCO/asma/fibrosi polmonari/altre patologie respiratorie gravi | Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossigenoterapia   |
| 02-Malattie cardiocircolatorie                                    | Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock cardiogeno  |
| 03-Condizioni neurologiche  | Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali infantili; pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni.        |
| 04-Diabete/altre endocrinopatie severe quali morbo di Addison     | Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vasculopatia periferica con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3 |
| 06-Fibrosi cistica  | Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base   |
| 08-Insufficienza renale/patologia renale                          | Pazienti sottoposti a dialisi  |
| 09-Grande obesità   | Pazienti con BMI maggiore di 35  |

## Fase 2 – Estremamente vulnerabili, a prescindere dall'età (2 di 2)

| Aree di patologia   | Definizione   |
|---|---|
| 11-Malattie autoimmuni – immunodeficienze primitive   | Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza   |
| 13-Malattie cerebrovascolari  | Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con rankin maggiore o uguale a 3 |
| 14-Patologia oncologica e talassemica   | Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure. Genitori di pazienti sotto i 16 anni di età. Pazienti affetti da talassemia           |
| 15-Sindrome di Down   | Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili  |
| 16- Trapianto di organo solido: in lista di attesa e sottoposti a trapianto emopoietico dopo 3 mesi dal trapianto ed entro 1 anno dalla procedura | Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle tempistiche specificate, che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica in terapia immunosoppressiva                                      |
| <b>Totale</b>   |   |